

Descriere produs

Contribuie la:

- mentinerea concentratiei normale a glucozei in sange
- functionarea normala a pancreasului endocrin
- protejarea organismului impotriva stresului oxidativ.

Mod de administrare

Adulti: cate 2 comprimate de 3 ori pe zi, cu 30 minute inaintea mesei.

Tineri intre 15 si 18 ani: cate 1 comprimat de 3 ori pe zi, cu 30 minute inaintea mesei.

Copii intre 7 si 14 ani: cate 1/2 comprimat de 3 ori pe zi, cu 30 minute inaintea mesei.

Copii sub 7 ani: cu recomandarea medicului.

Comprimatele se inghit cu apa sau se sfarama in gura (absorbția substantelor bioactive este mult mai rapida). In caz de dificultate la inghitire, comprimatele se pot rupe in doua.

Contraindicatii

Din cauza continutului in alcool nu se recomanda administrarea in: hepatite virale, toxice si metabolice, steatoza hepatica, ciroza hepatica, sarcina si alaptare.

Persoane cu deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenaza, alergii la oricare dintre componentele produsului, tratamente care nu permit consumul de alcool.

Precautii

Se administreaza cu prudenta la persoanele cu gastrita hiperacida si ulcer gastric si duodenal (din cauza continutului in alcool, poate creste aciditatea gastrica).

Atentionari

A nu se lasa la indemana si la vederea copiilor mici.

Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos.

A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.

La persoanele cu diabet zaharat insulino-dependent se recomanda controlul riguros al glicemiei, prin inregistrarea zilnica a valorilor glicemiei si ajustarea dozelor de insulina in functie de noile valori obtinute.

Despre diabetul zaharat

Diabetul zaharat este una dintre cele mai frecvente afectiuni endocrine, factorii declansatori care determina aparitia acesteia fiind: predispozitia ereditara, alimentatia excesiva (in special excesul de dulciuri), socurile emotionale, stresul etc. Boala se datoreaza secretiei insuficiente de insulina la nivelul pancreasului, ceea ce conduce la cresterea glicemiei (nivelul de glucoza din sange) peste limitele normale. Cele mai frecvente tipuri de diabet zaharat sunt:

diabet zaharat de tip 1 sau insulino-dependent si diabet zaharat de tip 2 sau noninsulino-dependent. Controlul glicemiei reprezinta unul din cei mai importanti factori de evaluare ai afectiunii, pentru mentinerea starii de sanatate fiind necesara aducerea glicemiei la valorile normale. In general, complicatiile diabetului zaharat afecteaza diferite organe (ochii, rinichii, sistemul nervos, vasele sanguine), ceea ce conduce la aparitia retinopatiei diabetice, insuficientei renale, polineuropatiei diabetice sau arteritei diabetice, care evolueaza cu gangrena si amputare de membre. Pentru mentinerea glicemiei in limite normale este necesara respectarea stricta a regimului alimentar si administrarea de medicamente si/sau produse naturale cu actiune hipoglicemianta si de stimulare a secretiei pancreatice de insulina.